

## Ordonnances type PrEP

TRUVADA / EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL (fumarate) 245 mg cp

### **Pour les personnes ayant des rapports vaginaux**

#### **Schéma continu :**

Un cp par jour, tous les jours, au même moment de la journée, pendant ou en dehors d'un repas

Le traitement est efficace au bout de 7 jours et ne peut être arrêté que 7 jours après le dernier rapport sans préservatif.

QSP 3 mois

### **Pour les personnes ayant des rapports anaux exclusifs**

#### **Schéma continu :**

Deux cp en une prise le premier jour puis un cp par jour, tous les jours, au même moment de la journée, pendant ou en dehors d'un repas

Le traitement est efficace au bout de 2 heures et ne peut être arrêté que 2 jours après le dernier rapport sans préservatif.

QSP 3 mois

#### **ou Schéma discontinu :**

Deux cp en une prise le premier jour puis un cp par jour, tous les jours, au même moment de la journée, pendant ou en dehors d'un repas pendant toute la période d'activité puis 2 j après le dernier rapport

Le traitement est efficace au bout de 2 heures et ne peut être arrêté que 2 jours après le dernier rapport sans préservatif.

Préférer si possible les génériques de cp sous blister plutôt qu'en flacons en vrac.

QSP 3 mois